

公立尾陽病院を
より知っていただくために…

薬の飲み方

(後編)

内科 松本 一明



先月に続いて薬の話をし
ます。

まずは、服用時間です。それ
には主に次のようなものがあり
ます。

- 食前……食事のおよそ30分前
- 食直前……食事のすぐ前
- 食直後……食事のすぐ後
- 食後……食事のおよそ30分後
(または以内)
- 食間……食事のおよそ2時間
後
- 就寝前……寝る少し前

一般的に食後に飲むものと言
われている一番の理由は、胃の
中に食べ物がある状態で薬を飲
んだ方が胃に対する刺激(胃を
荒らすこと)が少なくなるから
です。また、食後とすることで
薬を飲み忘れないようにするた
めでもあります。食後の30分と
いうのはおおよその目安で、30
分以内という意味です。食事を
終えて一息ついたところに飲む
と忘れなくていいと思います。

これに対し、胃の中に食べ物
があると吸収が悪くなる薬や食
欲を増進させる薬、胃を荒らす
ことが少ない薬(漢方薬)などは、
食事の前に飲むことになります。

これらの薬は、食前に飲み忘れ
たら食後に飲んでもいいのです
が、糖尿病の薬で食後の血糖の
上昇を防ぐ薬などのように食前
に飲まないという意味のない薬もあ
るので注意してください。

また、食間というのは、ご飯
を食べている途中で飲む薬では
なく食事と食事の間という意味
なので、食事の2時間くらい後
にお飲みください。いずれにし
ろ、「ご飯を食べなかったから薬
も飲まなかった」というのは間
違いです。

基本的に、薬はコップ1杯程
度の水かぬるま湯で飲むもので
す。昔からお茶で薬を飲んで
いけないと言われてきました
が、最近の研究で問題がないこ
とが分かりました。しかし、コ

ーヒーやグレープフルーツジュ
ース、ビールなどは薬によつて
は副作用が出るものもあります
ので、これらのもので飲むこと
はおやめください。

最近、口腔崩壊錠といって、
水なしでも飲める薬が販売され
てきました。しかし、普通の薬
を水なしで飲むと、のどの奥や
食道で止まってしまい、炎症を
起こしたり、かいようになった
りすることがありますのでおや
めください。寝そべって飲むの
も薬が引つ掛かる原因になりま
すので体を起こして飲むよう
にしてください。また、カプセル
剤はくつきやすいので、でき
れば先に水でのを潤してから
飲むようにしてください。

皆さんの中で飲み方が分から
ない方やどうしてもこの時間は
薬が飲みづらいという方など、
薬に関する質問や相談のある
方は、当院薬剤部や薬を処方さ
れている薬局へご相談ください。

問い合わせ先

公立尾陽病院
〒490-1111

甚目寺町大字甚目寺字山ノ浦
148番地

● 問い合わせ時間

午前8時30分～午後5時15分

※土日・祝日は除く

☎(444)0050

FAX(444)0064

HP <http://www.bjyo-hosp.jp/>



『過ぎたるは
及ばざるがごとし』

「過ぎたるは及ばざるがごとし」とい
う言葉がありますが、歯磨きもやり過
ぎはいけません。ちょうどよい加減を
会得する必要があります。次の状態に
なるとやり過ぎかもしれません。

① 歯磨きを始めると、かすかに出血す
る。

② 歯肉が下がって歯の根の部分が露出
し、歯が長くなったように見える。

③ 歯ブラシを当てるとピリピリとした
痛みを感じる。

④ 冷水が歯にしみる。

歯周病の場合は、歯肉が赤く腫れ歯
ブラシがちよつと触れただけで出血が
起こり、しばらく血が止まりません。
歯磨きのやり過ぎの場合は、歯肉は引
き締まっていて歯ブラシに血がついた
という程度のもので、出血もすぐに止
まります。歯磨きし過ぎると歯肉がや
せて歯の根面が露出してしまいます。
根面は冷たい水や風が当たるとしみた
り、痛みを感じます。このように虫歯
でないのにしみたり、痛みを感じる状
態を「知覚過敏」といいます。知覚過敏
の歯が虫歯になったと誤解し、歯磨き
を以前にも増して行つてこじらせる方
もいるので注意してください。一度正
しい歯磨きの仕方をかかりつけ歯科医
で教わりましょう。

ストップ・ザ 交通事故
ハンドルを 握った瞬間 責任感