

ロタウイルス感染症予防接種を受ける方へ

★ロタウイルス胃腸炎とは★

口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く、乳幼児期のうちにほとんどの子どもが感染します。ロタウイルスによる胃腸炎は、急激な嘔吐と水様性の下痢便を頻回に排泄し、発熱が3割から5割程度みられます。下痢・嘔吐が激しくなると脱水症状を起こす場合もあり、まれに腎不全、脳症などの合併のため入院治療に至るケースがあります。生後、すぐに感染する場合もあるので、早めに接種を開始し、完了させましょう。

1 ワクチンの種類・接種時期・接種回数

ワクチンの種類	ロタリックス® (経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン)	ロタテック® (五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン)
接種時期	出生6週から24週0日後まで 標準初回接種は 生後2か月～出生14週6日後まで	出生6週から32週0日後まで 標準初回接種は 生後2か月～出生14週6日後まで
接種回数	2回 (27日以上の間隔をあける)	3回 (27日以上の間隔をあける)

※2種類とも効果に差がありませんが、接種回数が異なりますので主治医と相談して選択してください。原則として、同一ワクチンを接種してください。

※飲むワクチンのため接種直前(30分ほど)は授乳を控えましょう。うまく飲み込めなかったり吐き戻しても、わずかでも飲み込みがあれば効果に問題はなため、飲み直す必要はありません。

※接種後1～2週間は腸重積症の発症に注意が必要です。接種前に「6 腸重積症について」を必ずお読みください。

2 接種場所 裏面「ロタウイルス感染症予防接種指定医療機関」をご覧ください。

3 一般的注意

(1) 事前に予約が必要です。(詳しくは各医療機関にお問い合わせください。)

予約時に伝えること

予防接種の種類：ロタウイルス感染症予防接種
子どもの氏名、生年月日、保護者名、住所、電話番号
最近接種した予防接種名と接種年月日
(2回目以降の場合) 前回のロタウイルスワクチンの種類

(2) 予約日に、都合により接種できない場合や体調が悪い場合は、予約先に連絡し予約日を変更してください。

(3) 予診票は事前に記入してください。

- ・太枠で囲ってある部分を、黒のボールペンで記入してください。
- ・診察前体温は、接種前に医療機関で測定した体温を記入します。

(4) 接種当日は母子健康手帳、予診票、本人確認書類(マイナ保険証等)、子ども医療費受給者証を持参してください。

(5) 接種は健康状態の良好なときに受けてください。

(6) 本紙「ロタウイルス感染症予防接種を受ける方へ」をよく読み、必要性や副反応についてよくご理解のうえ、接種を受けてください。

(7) ガンマグロブリン製剤の注射を受けたことがあるお子さんの接種時期については、かかりつけ医と相談してください。

(8) 原則、任意で接種したものは、定期接種に相当するとしてカウントします。

4 予防接種を受けることができない方

- (1) 明らかに発熱のある方(医療機関で37.5℃以上)
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- (3) 接種しようとする接種液の成分によって、「アナフィラキシー※」を起こしたことが明らかな方
※アナフィラキシーとは接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
- (4) 未治療の先天性消化管障害(メッケル憩室等)や腸重積症の既往のある方、重症複合免疫不全症(SCID)を有する方
- (5) その他、医師が接種不適当と判断した場合、また感染性の疾患に罹患・接触した場合も、一定期間接種できないことがあります。


5 接種後の注意・ワクチンの副反応

接種直後は、医療機関で30分ほど様子を見てから帰宅してください。ワクチン接種後2週間ほどは、便の中にワクチンのウイルスが含まれることがあります。おむつ交換の後など丁寧に手を洗ってください。主な副反応としては、下痢、嘔吐、胃腸炎、発熱、ぐずりなどがあります。また、腸重積症の症状に注意し、異常を感じた場合は、すぐに接種した医療機関を受診してください。

重い健康被害が生じた場合、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したときは、予防接種健康被害救済制度の給付対象となります。

6 腸重積症について

腸重積症とは、腸が腸に入り込み、閉塞状態になることです。(下図)。0歳児の場合、ロタワクチンを接種しなくても起こりうる病気で、もともと、3～4か月齢ぐらいから月齢が上がるにつれて多くなります(右下グラフ)。早めに予防接種を開始し、完了させることが推奨されています。



腸重積症は、手術が必要になることがあります。発症後、早く治療すれば、ほとんどの場合、手術をせずに治療できます。以下のような症状が一つでも現れたら、腸重積症が疑われます。

- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 嘔吐を繰り返す
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血便がでる

このような症状に気付いたら、すみやかに接種した医療機関を受診してください。接種した医療機関とは別の医療機関を受診する場合は、医師にロタワクチンを接種したことを伝えてください。

お問い合わせは各市町村の保健センターへ

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

令和8年度 ロタウイルス感染症 予防接種指定医療機関一覧

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

※令和9年4月1日以降に接種される場合は、指定医療機関が変更されている可能性がありますので、各保健センターへお問い合わせください。

※指定医療機関等の都合により変更になる場合があります。

市町村名	医療機関名	電話番号
津島市 市外局番 0567	井田医院	26-2676
	かたおかクリニック	58-3523
	加藤医院	24-1515
	すぎの大人こどもクリニック	25-8122
	杉山クリニック	26-2006
	貴子ウィメンズクリニック	23-5786
	田中こどもクリニック	26-2409
	つしまこどもアレルギークリニック	55-8718
	つしまセントラルクリニック	55-9111
	坪内医院	28-6300
	なぎさクリニック	55-7360
	はせ川外科	24-3370
	ひだかファミリークリニック	26-2220
	平野医院	26-7584
	松永医院	26-2022
ワシノ医院	26-2851	

市町村名	医療機関名	電話番号	
愛西市 市外局番 0567	加藤クリニック	22-3000	
	谷本医院	28-9888	
	角鹿医院	28-0135	
	とみよしこどもクリニック	33-0015	
	まえだこどもクリニック	22-1211 予約専用 22-1233	
	前田ホームクリニック	23-2414	
	レディスケア和田クリニック	33-1177	
	弥富市 市外局番 0567	あいち診療所おふくろ	67-7202
		小笠原クリニック	56-5533
小林医院		65-6655	
篠田医院		64-2111	
杉本クリニック		68-5656	
すずきこどもクリニック	52-1000		
日比クリニック	65-6666		

市町村名	医療機関名	電話番号
あま市 市外局番 052	浅井外科クリニック	441-8002
	安藤クリニック	444-1508
	伊東医院	444-1033
	伊藤医院	441-2408
	岩間クリニック	442-7030
	栄生堂医院	444-2008
	駅前ふじたクリニック	462-0222
	小野クリニック	445-2221
	加藤医院	441-5557
	近藤内科クリニック	444-0016
	近藤療院 六町クリニック	443-7145
	しげやす内科クリニック	449-5550
	杉村医院	443-1331
	原クリニック	441-1117
	フジノ内科	441-2713
	マスブン医院	445-3037
	宮地クリニック	444-1064
	村上医院	443-7771
	もちづき内科&はるかこどもクリニック	443-3320
	吉岡内科クリニック	441-5211
よつ葉ファミリークリニック	526-6767	

市町村名	医療機関名	電話番号	
大治町 市外局番 052	安藤医院	444-2301	
	こうのう内科	443-3631	
	たかだこどもクリニック	443-3350	
	中原クリニック	449-1313	
	はら医院	443-6662	
	みきクリニック	444-7005	
	みずのホームクリニック	444-2270	
	むらかみファミリークリニック	445-1222	
	蟹江町 市外局番 0567	飯田ファミリークリニック	94-4891
		回生堂クリニック	96-5707
かとうクリニック		96-2233	
かにえ診療所		94-1611	
久保田内科クリニック		96-2600	
耳鼻咽喉科たけうちクリニック		94-5505	
すぎうらクリニック		97-0700	
成山ひだまりクリニック		94-7680	
ふなとクリニック		95-0088	
前田内科		95-8434	
増田医院	95-1615		
やまだクリニック	96-5600		
山本医院	95-9311		
飛島村 市外局番 0567	加藤胃腸科・内科 とびしまこどもクリニック	52-2000	

◎お問い合わせは各市町村の保健センターへ

津島市、愛西市、弥富市、あま市

大治町、蟹江町、飛島村